



内視鏡検査を受ける方へ



血栓症の発症を抑制するお薬
(抗血栓薬療法)
を飲んでいませんか



- 1、抗血栓療法を行っている方は、内視鏡検査で組織検査（生検）を行うことができません。

抗血栓薬内服中に生検を行うと、大出血を起こしトラブルとなることがあります。

- 2、生検を行うためには抗血栓薬を一時的に休んで（休薬）頂く必要があります。

抗血栓薬療法は、脳梗塞や心筋梗塞の再発予防などですが、休薬によって再発率が高まることを理解して頂く必要があります。

- 3、抗血栓薬を休んで頂くことは、内視鏡を予約した医師の指示で行われます。

休薬の安全性を保証するものではありません。事前に抗血栓薬の処方を受けている主治医と相談されるようお願いいたします。

- 4、抗血栓薬の処方を受けている方は、原則休薬せずに検査を受けて頂くことをお勧めします。

生検が必要と判断されたときに改めて検査を受けて頂くことを提案しています。

何度も内視鏡を受けることが負担とお考えになる方は、事前に主治医、検査担当医と十分ご相談してください。

- 5、現在服用しているお薬が分かるものを持参してください。

現在飲んでいるお薬または、お薬手帳や薬の説明書等、お薬が分かるものを持参してください。

抗血栓薬休薬の説明書

あなたが受ける内視鏡検査または治療日は 月 日です。
 抗血栓薬・抗凝固薬の処方を受けている
 主治医と相談されるようお願いいたします。



下記のお薬は当院採用の抗血栓薬・抗凝固薬です。後発品（ジェネリック薬）を含めると多くのお薬があります。

お薬を休んで頂く期間を説明します。必ず処方を受けている主治医と相談してください。

| 薬の名前 | 後発品の薬品名 | お薬を休む期間 |
|----------|---------|--------------|
| ●パナルジン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●バイアスピリン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●バファリン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●プラビックス | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●プラザキサ | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●エパデール | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●ワーファリン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●プレタール | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●コメリアン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●ペルサンチン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●アンプラーグ | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●ドルナー | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●オパールモン | () | → 月 日から 日間休薬 |
| ●その他 | () | → 月 日から 日間休薬 |
| | () | → 月 日から 日間休薬 |